

Material para la toma de muestra: Tubo que contiene gel y tórula (Cary blair)

Lugar de entrega material: Dependencias del Laboratorio clínico Ancud, Secretaría de laboratorio.

Requisitos:

1. Idealmente obtener la muestra antes de comenzar el tratamiento con antibióticos y sin estar ingiriendo laxantes. De no ser así informe al personal del laboratorio el tratamiento que está recibiendo.
2. La muestra de deposiciones debe ser fresca, recién emitida, no mezclada con orina, por lo tanto se recomienda realizar las deposiciones en un recipiente limpio y seco.

Indicaciones:

1. Retire la tórula del tubo, impregne solamente el algodón con deposición, una vez recogida la muestra introduce la tórula hasta el medio de transporte (gel).
2. Si el paciente utiliza pañal, la muestra puede tomarse desde el pañal, siempre y cuando la muestra no esté mezclada con orina, crema, aceite o talco. También puede tomar la muestra introduciendo la tórula en el tracto rectal unos 3 centímetros, girando 3 a 4 veces.

Conservación: Mantener en lugar fresco a temperatura ambiente un máximo de 12 horas.

Transporte: Comprobar que el tubo esté bien cerrado, limpio y colocar en una bolsa y llevar al Laboratorio.

Lugar de entrega muestra: Dependencias del Laboratorio clínico Ancud, Secretaría de laboratorio.

Tiempo de respuesta examen: 3 días hábiles

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte al:



652-622254



contacto@laboratorioancud.cl



Anibal Pinto 308, Ancud